


①

مسكنات الألم

• كيف يحدث الألم : إشارات كيميائية بواسطة الأعصاب الموجودة في العضو المصاب ← ← ← النخاع الشوكي ← ← ← المخ (الذي بدوره ينبه الجسم لوجود الألم)

• أنواع الألم :



• آليات العلاج :

تعتمد على تنبؤات عديدة مثل :
 نوع الألم - طبيعته - مدى تأثيره على الحياة اليومية
 من خلال هذه يمكن للألم دواء تناول أي شيء وهناك منه يلجأ
 للمسكنات عند أول بادرة للألم

⑤

● العلاج:

① Paracetamol - بنارول - بيرال - إيبوك

طريقة عمله

- غير معروفة بدقة ويتقيد أنه يمنع تكوين نواتج الألم خلال الحارة العصبية فيوقف الشعور بالألم.
- يستخدم في الألم الخفيف إلى المتوسط.
- ليس له تأثير مضاد للتورب.

الجرعة

≥ ٤ جم (٨ أقراص ٥٠٠ مجم) / يوم

- ↑ الجرعة عند ذلك سم تسمم كبدى خطير مميتا في بعض الأحيان
- وإذا لاحظ المريض أى مبرحة أو أعراض يتوقف عن تناوله:
- غثابه - ألم في المعدة - فقدان الشهية - بول داكن - براز طيني
- رقاقه (دايفر لون الجلد والعنيد).

⑤ NSAIDs

(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)

Aspirin - Diclofenac - Naproxen

Ibuprofen)

أسيك - إندوميتاسين - ألوفين - بروكسين - بروفيين ... الخ

↓ COX enzyme

طريقة عمله

(يقلل إنتاج الدقة المصنعة للتورب والألم في الجسم)

(٣)

- مكبر للثلم - خافض للحرارة - مضاد للتهتك
- يستعمل من الثلم ليطر الى العسل .

ملاحظة * SAIDs (Corticosteroids)

هيدروكورتيزون - بريدنيزولون

- ↓ الالتهاب وتخفف للثلم أمواتاً .
- تستخدم غالباً لعلاج الأعراض التالية :

* Arthritis * Asthma * Bursitis

* Lupus * Corn's disease

* Carpal tunnel syndrome * ulcerative colitis

* Tendonitis (e.g trigger Finger, tennis elbow)

- تسليح ال steroids أن تقلل من قابلية جهاز المناعة
لمقاومة العدوى .

- تسليح ال oral corticosteroids أن تسبب :

زيادة الوزن - صباع - تغير المزاج - صعوبة النوم

(Celebrex) celecoxib (٣)

(Arcoxia) etoricoxib &

- تتميز بعدم وجود تأثير سلبي على المعدة
- تستخدم من الثلم المتوسطة الى الشديدة

- ٤٦
- تصلح للمرضى اللذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل عرقطة المعدة).
 - تؤخذ بعد الأكل مع قليل من الماء لتسهيل البلع أو مع عصير فواكه.
 - أذنين في الجهاز الهضمي.
 - تناولها طويلاً مع مشاكل في الكلى (تتأخر في التخلص من الدواء).
 - يتوقف عن تناول المريض فوراً إذا لاحظ أي من الأعراض التالية:
 - * براز أسود أو دودي * سعال دوي
 - * قشعريرة * غثابة شديدة * ألم معدة
 - * إسهال * حمى أكثر من ٣ أيام * التشنج الحاد
 - * طفح مبرقش مع حكة * تغير في الرؤية على الجلد.

٤٧ opioid analgesics

(المسكنات الأفيونية) (Narcotics)

- مشتقة من الأفيون (opium).
- تستخدم من الألم الشديد الذي لا يستجيب للعلاجات غير الأفيونية.
- الأفيون كالألم الحاد من مرض السرطان.
- مشتقة منه ↓ مشتقات الألم من الجهاز العصبي المركزي
- أشهره

Morphine codeine Tramadol

⑤

- تعتبر مواد مندمجة لا تسمى الادوية طبية .

- مشاكلها * الادمان (Addiction)

* التسود (tolerance) حيث نحتاج

الجرعة التي يحتاجها المريض لتكثير الألم بشكل

مضطرب عند استعمالها لفترات طويلة .

⑤ العلاجات الأخرى

* مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة (Tricyclic antidepress)

- أمثلتها

- Amitryptaline (Tryptizol)

- Gabapentin (Neurontin)

- pregabalin (Lyrica)

- carbamazipin (Tegretol)

- Imipramine (Tofranil)

- تستخدم في الألم العصبي المنشأ الذي يعاني منه بعض مرضى السكر

- كعلاج مساعد للحالات الأخرى من حالات الألم

السريرية والوظيفية .